



Le biote comme outil pour le suivi des herbicides sur le littoral Bas-Normand.

Celine Passignat, Olivier Basuyaux, Stéphane Le Glatin, A. Guedas, Christelle Dubreule, Camille Tanguy, Valérie Bouchart

► To cite this version:

Celine Passignat, Olivier Basuyaux, Stéphane Le Glatin, A. Guedas, Christelle Dubreule, et al.. Le biote comme outil pour le suivi des herbicides sur le littoral Bas-Normand.. Journées Information Eaux 2018, Oct 2018, Poitiers, France. <hal-03429077>

HAL Id: hal-03429077

<https://normandie-univ.hal.science/hal-03429077v1>

Submitted on 15 Nov 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Contexte

La surveillance des milieux aquatiques est une obligation réglementaire dans le cadre de deux directives (Directive cadre sur l'eau 2000/56/CE et directive cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE). Ainsi, des programmes de biomonitoring se sont développés afin d'évaluer les quantités et la distribution de certains contaminants dans les individus d'espèces choisies pour leurs particularités bioécologiques. Cette méthodologie est appliquée en France pour les métaux et quelques molécules organiques (HAP, PCB) au sein du Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du milieu marin (ROCCH anciennement RNO) de l'IFREMER. Pour ce projet (2014-2016), 34 herbicides les plus susceptibles d'impacter le milieu ont été sélectionnés selon différents critères : leur quantité utilisée en Basse Normandie, leur toxicité potentielle et leur rémanence [1].

Zones d'études

Quatre sites de la
côte normande :



Photo 1 : Photo du site de Lingreville




Figure 2 : Localisation des points de suivi

Matériels et méthodes

3 espèces intégratrices sélectionnées :



Photo 3 : Hymeniacidon perlevis



Photo 4 : Mytilus Edulis



Photo 5 : Crassostrea gigas

Utilisation de cages
pour certains sites



Planning de prélèvements :



Les biotes sont nettoyés, décoquillés, rincés et congelés à -20°C

RÉFÉRENCES

[1] Laurens, Y (2013) Directive Cadre sur l'Eau (DCE) à la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) : Suivi des micropolluants dans le biote marin normand, réalisée à l'initiative de l'Agence de l'eau Seine Normandie. AESN, Septembre

[2] Basuyaux O., C. Caplat, S. Le Glatin & ML Mahaut, 2012. Utilisation d'*Hymeniacidon perlevis* comme bioindicateur de l'environnement littoral. Programme SPONTOX 2011-2012. Rapport technique : 145 p.

[3] Anastasiades M, Lehotay SJ, et al. Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) approach for the determination of pesticide residues, 2002, European Pesticide Residues Workshop, EPRW, Rome, Book of Abstracts

[4] Lazartigues A, Wiest L, Baudot R, Thomas M, Feidt C, Cren-Olivé C. Multiresidue method to quantify pesticides in fish muscle by QuEChERS based extraction and LC-MS-MS. Anal Bioanal Chem (2011) 400: 2185-2193

Analyse par UPLC-MS/MS




Figure 1 : Étalonage linéaire du diflufenican

Division en deux analyses :
la première de 32
molécules décrite par la
suite et la seconde
contenant spécifiquement
le glyphosate et l'AMPA



Chaîne Waters Acquity
UPLC couplée au
spectromètre de masse
en tandem Xevo TQ MS


- Colonne Acquity UPLC BEH C18 : 150 mm x 2,1, 1,7 µm (Waters®)
- Température du four : 40 °C
- Débit de la phase mobile : 0.40 ml/min



Temps en min	EUP 0.1 % AF (en %)	ACN 0.2 % AF (en %)
0	90	10
0,5	90	10
4	50	50
16	10	90
16,2	0	100
20	0	100
20,2	90	10
27	90	10

Gradient d'élution

Temps d'analyse = 27 min



Préparation d'échantillons

Avant injection, transfert de
200 µL de l'extrait dans un
pilulier et ajout de 800 µL
d'une solution d'acide
formique à 0.05 % dans l'eau




Transfert de 2 mL du surnageant,
ajout de 20 µL d'une solution
d'acide formique à 5 % dans ACN.
L'extrait est conservé au
congélateur (-20 °C)




Transfert de 6 mL de la phase supérieure
(ACN) dans un tube de purification dSPE.
Agitation pendant 1 min au vortex puis
centrifugation (3000 rpm, 4 min, 4°C)

Broyage à
l'ultraturax ou au
broyeur à couteaux
pour les éponges



Pesée de 10 g
d'échantillon et ajout
des étalons internes



Ajout de 10 mL
d'acétonitrile et agitation
pendant 1 min



Ajout du sachet d'extraction
QuEChERS (Méthode EN)
puis agitation pendant 1 min



Centrifugation (3000
rpm, 4 min, 4°C)

Caractérisation de méthode

Suivi des recommandations du guide LAB GTA 26 (Décembre 2010) et des prescriptions de la norme NF V 03-110 (2010)

Détermination des taux de récupération :
100% des molécules ont un rendement moyen
compris entre 80 et 120%




Figure 2 : Rendements moyens (n>4) pour chaque matrice à 10µg/kg poids frais

Détermination des profils d'exactitude pour l'ensemble des
molécules à minimum deux niveaux (LQ = limite de quantification
et LMR = Limite maximale en résidus




Figure 3 : Résultats de la caractérisation de méthode du diflufenican à la limite de quantification (0,5µg/kg de poids frais) et à la LMR par défaut c'est-à-dire à 10µg/kg PF

Détermination de la limite de quantification
pour chaque molécule




Figure 4 : Pourcentage des molécules validées en fonction de leur limite de quantification (LQ)

Résultats

Présence de 5 molécules
quantifiées sur les 33 analysées




Figure 5 : Diflufenican




Figure 6 : Isoproturon




Figure 7 : Pendiméthaline




Figure 8 : Glyphosate




Figure 9 : Acide aminométhylphosphonique (AMPA)

Sélection des espèces intégratrices

Les concentrations dans les moules et les huîtres sont plus élevées
pour le diflufenican, l'isoproturon et la pendiméthaline.

	Site A			Site B			Site C			Site D		
	Moules	Huîtres	Eponges	Moules	Huîtres	Eponges	Moules	Huîtres	Eponges	Moules	Huîtres	Eponges
sept-14	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	-	-
déc-14	0,8	2,2	0,5	<0,5	1,6	<0,5	1,3	1,9	<0,5	3,1	5,1	-
mars-15	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,8	<0,5	0,5	1,9	<0,5	2,3	2,0	<0,5
avr-15	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,7	1,1	<0,5	4,7	-	-
mai-15	1,4	1,4	<0,5	0,5	0,8	<0,5	0,9	0,9	<0,5	1,0	-	-
juin-15	0,5	0,9	<0,5	0,9	1,0	0,7	1,2	1,6	0,5	1,1	0,8	-
sept-15	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5

Tableau 1 : Résultats en pendiméthaline pour les trois espèces et les quatre sites en µg/kg de poids frais. Les tirets dans le tableau représentent les cages vandalisées lors de l'étude

Les concentrations dans les éponges sont plus élevées pour le glyphosate et l'AMPA

	Site A			Site B			Site C			Site D		
	Moules	Huîtres	Eponges	Moules	Huîtres	Eponges	Moules	Huîtres	Eponges	Moules	Huîtres	Eponges
sept-14	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	-	-
déc-14	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD
mars-15	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD
avr-15	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD
mai-15	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD
juin-15	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD
sept-15	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD	<LD

Tableau 2 : Résultats en Acide aminométhylphosphonique (AMPA) pour les trois espèces et les quatre sites en µg/kg de poids frais.

Réalisation de la surveillance du diflufenican avec la moule -
Comparaison temporelle et spatiale de cet herbicide




Figure 10 : Comparaison en diflufenican en fonction des lieux et des périodes de prélèvements dans la moule

Les concentrations les plus élevées en diflufenican sont observées sur le site D puis dans une moindre mesure sur le site C. Pour ces deux sites, les teneurs sont les plus fortes en septembre 2015

Conclusion

Ces espèces intégratrices constituent un outil de surveillance bien adapté pour les herbicides les plus susceptibles d'impacter le milieu. Les données collectées lors de cette étude montrent la complémentarité des espèces selon la nature des molécules suivies. Les huîtres, les moules et les éponges pourraient ainsi être utilisées comme espèces sentinelles dans le cadre d'un réseau de surveillance des pesticides les plus utilisés en Normandie. Ces espèces sont présentes dans de nombreux secteurs du littoral ou, à défaut, pourraient être placées dans des cages.

